

Белорусский государственный медицинский университет
1-я кафедра терапевтической стоматологии

Реставрация клиновидных дефектов

ассистент Урбанович Е.А.

Было проведено двухкратное отбеливание «Opalescence Boost» передней группы зубов верхней и нижней челюстей. Цвет зубов изменился на верхней и на нижней челюстях до А2 по шкале Vita.

Из анамнеза: пациентка А., обращалась с жалобами на темный цвет зубов в переднем отделе на обеих челюстях. Зубы верхней челюсти (1.5 – 2.5) имели желтый оттенок, по стандартной шкале Vita цвет соответствовал А3, а зубы нижней челюсти (3.5 – 4.5) по шкале – А4. Клиновидные дефекты на передней группе зубов 1.3, 1.1. Клиновидные дефекты под некачественными пломбами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. В процессе отбеливания клиновидные дефекты на материал не реагировали.

до отбеливания и реставрации



Реставрация клиновидных дефектов проводилась через месяц после отбеливания фотокомпозиционным материалом «Filtek Ultimate».



Рекомендации:

- * Подбор цвета и саму реставрацию проводить не раньше, чем через 14 дней после завершения процедуры отбеливания;
- * Использовать только реставрационные материалы для отбеленных зубов;
- * Осуществлять контроль за реставрациями у пациента (2 раза в год).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!