

БЕЛАРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
2-я кафедра терапевтической стоматологии

ГОРМОНИЗАЦИЯ ЦВЕТА ЗУБОВ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЗОРЦИН- ФОРМАЛИНОВЫМ МЕТОДОМ

АССИСТЕНТ ШЕЛЕГ К.Н.
ДОЦЕНТ ДЕЛЕНДИК А.И.

МИНСК 2021

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

На сегодняшний день большинство людей понимает, какую роль в нашей жизни играет белоснежная улыбка.

Красивые, белые зубы это не только признак хорошего здоровья, но и элемент культуры, символ благополучия и успешности.

Отбеливание зубов, неинвазивный способ улучшения эстетики, привлекающий всё больше врачей-стоматологов и пациентов.

Множество причин, вызывающих различные виды окрашивания твердых тканей зубов могут осложнять составление плана лечения.

ПАЦИЕНТКА В., 29 ЛЕТ

Обратилась с жалобами на неэстетичный цвет зубов.
Из анамнеза: применение в детском возрасте препаратов тетрациклина. Эндодонтическое лечение зубов 11, 12 в ЦРБ.



ДИАГНОЗ

K00.83 Изменение цвета зубов в процессе формирования вследствие применения тетрациклина

Тетрациклиновое окрашивание возникает в результате системного применения тетрациклина, его последующего хелатного соединения и образования комплексов с ионами кальция в дентине. Изменение цвета зависит от типа принимаемого тетрациклина, дозировки, длительности приема, а также от возраста пациента в момент назначения. Пораженные зубы прорезываются желтыми или коричнево-серого цвета.

K03.78 Изменения цвета твердых тканей зубов после прорезывания при эндодонтическом лечении

Окрашивание при эндодонтическом лечении. Препараты, содержащие резорцин-формалиновую смесь, придают зубу коричневое окрашивание после эндодонтического лечения.

ЛЕЧЕНИЕ

1. Повторное эндодонтическое лечение зубов 11, 12 через временную пломбировку гидроокисью кальция.



2. Наружное отбеливание системой Beyond Polus Advanced - гель с содержанием 35% перекиси водорода.



ЛЕЧЕНИЕ

3. Внутреннее отбеливание зубов 11, 12 по методике “WALKING BLEACH” материалом Opalescence Endo - гель с содержанием 35% перекиси водорода.



4. Домашнее ночное отбеливание зубов с использованием индивидуальных капп и материала Opalescence PF 10% - гель с содержанием 10% перекиси карбамида.



ВЫВОДЫ

Учитывая анамнез пациента, клиническую картину в целом и результаты дополнительных методов лечения, можно выявить все причины возникновения окрашивания и составить комплексный план реабилитации пациента.

Сочетание различных методик отбеливания зубов может привести к более выраженному и стойкому результату отбеливания зубов.

Отбеливание зубов не всегда является единственным и самостоятельным методом лечения изменений цвета твердых тканей зубов. Оно также может проводится в качестве подготовительного этапа, с целью минимизации объема препарирования твердых тканей при последующей непрямой реставрации.