

Хронический эндометрит при бесплодии

О.Г. Дражина, Л.Ч.Недень, В.М. Савицкая

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность

- **Хронический эндометрит** – один из факторов, препятствующих наступлению беременности.
- Чаще всего у него нет выраженных клинических проявлений и порой его единственным признаком является бесплодие.

Актуальность

Обследование женщины в полном объеме, с применением современных методов исследования эндометрия помогает преодолению бесплодия, связанного с

- маточным и
- инфекционным факторами.

Цель

- Установить частоту встречаемости хронического эндометрита у женщин, впервые вставших на учет по бесплодию.
- Выработать тактику ведения пациенток с бесплодием в сочетании с хроническим эндометритом.

Материалы и методы исследования

- Исследование проводилось на базе отдела репродуктивного здоровья перинатального центра третьего уровня (родильный дом №2 г. Минска).
- Учтены все случаи выявления хронического эндометрита у женщин, взятых на учет по бесплодию в 2021 году.
- Гистологическое и иммуногистохимическое исследование проводилось на базе УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро г. Минска».
- Иммуногистохимическим методом определялись маркеры CD 138 и CD 56.

Результаты

- В отделе репродуктивного здоровья в 2021 году впервые взяты на диспансерный учет по бесплодию и обследованы 674 женщины.
- В алгоритм обследования таких пациенток с окончательно неустановленным фактором бесплодия включена обязательная! аспирационная биопсия эндометрия с последующим гистологическим и иммуногистохимическим исследованием перед проведением проверки проходимости маточных труб.

Результаты

- Выявлен хронический эндометрит у 92 из 674 обследованных пациенток.
- 13,6% среди впервые вставших на учет по бесплодию

Результаты

- Всего 92 случая
- Из них по гистологическим заключениям эндометрий фазы пролиферации с признаками хронического неспецифического эндометрита выявлен в 75 (81,5%) случаях.
- Еще у 17 (18,5%) бесплодных женщин хронический эндометрит был правомочен по положительным маркерам CD 138 и CD 56 при иммуногистохимическом исследовании.

Тактика

После установления диагноза были проведены:

- Курс противовоспалительной терапии (амбулаторно или стационарно с учетом пожелания пациентки)
- Курс реабилитации (ФТЛ, санаторно-курортное лечение)
- Контроль излеченности (аспирационная биопсия эндометрия, гистологическое исследование с иммуногистохимией)

Результаты

- Терапия по преодолению маточного фактора воспалительного генеза у женщин с бесплодием (проведена успешно)
- Может быть использована как этап подготовки к вспомогательным репродуктивным технологиям.

Заключение

- Хронический эндометрит у женщин, вставших на учет по бесплодию, выявляется в 13,6% случаев.
- Рационально взятие аспирационной биопсии эндометрия с гистологическим и иммуногистохимическим исследованием для раннего выявления маточного фактора бесплодия воспалительного характера.
- План ведения пациентки с бесплодием должен составляться индивидуально и способствовать своевременной диагностике, терапии и благоприятным исходам преодоления бесплодия всеми известными методами, в том числе и ВРТ.